# „COMPOFARM”

## Nawóz organiczny

FARMA
REDŁO

## Składniki i właściwości w świeżej masie

| | |
|---|---|
| 7,99 kg/t | Azot całkowity (N) |
| 3,61 kg/t | Azot rozpuszczalny (N) |
| 3,83 kg/t | Azot zaliczalny (N2) |
| 9,15 kg/t | Fosforan całkowity (PA) |
| 5,05 kg/t | Tlenek potasu całkowity (KP) |
| 3,56 kg/t | Tlenek magnezu całkowity (MgO) |
| 2,82 kg/t | Substancje czynne zasadowo |
| 0,84 kg/t | Siarka całkowita (S) |
| 7,66 g/l | Zawartość soli |
| 173 kg/t | Substancja organiczna |
| 35 kg/t | Próchnica C |
| 538 kg/m | Gęstość pozorna |
| 20,6% | Masa sucha |
| 9,1% | Wartość pH |

Próchnica w stałym stanie skupienia ze słomy. Nawóz jest źródłem materii organicznej, poprawiającej strukturę gleby, retencję wodną, właściwości sorpcyjne i aktywność biologiczną. Jego działanie jest zbliżone do obornika i kompostów roślinnych. Nawóz odgrywa ważną rolę w kształtowaniu żyzności gleb.

**Naturalna siła dla bujnych plonów!**

Farma Redło Sp. z o.o., Redło 13, 72-221 Osina
www.farmaredlo.pl
FarmaRedlo

## Instrukcja stosowania nawozu

Nawóz może być stosowany na wszystkich glebach pod wszystkie rośliny uprawy polowej, nie zaleca się stosowania na glebach o bardzo wysokiej zawartości przyswajalnego fosforu.

## Dawkowanie

- gleby o wysokiej zawartości przyswajalnego fosforu:

  **10 t/ha** raz w okresie **2 lat**

- gleby o średniej zawartości przyswajalnego fosforu:

  **10 t/ha/rok** lub **20 t/ha** raz w okresie **2 lat**

- gleby o niskiej zawartości przyswajalnego fosforu:

  **15 t/ha/rok** lub **30 t/ha** raz na **2-3 lata**

## Terminy stosowania

Stosować pod uprawy pożniwne lub przedsiewne. Dopuszcza się stosowanie na glebę w międzyrzędzia podczas wegetacji roślin.

## Sposób stosowania

Rozprowadzić równomiernie na powierzchni pola i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych.

## Przechowywanie

W pryzmach na utwardzonym podłożu, w bezpiecznej odległości od zbiorników i cieków wodnych. Zabezpieczać przed wiatrem.